les-schizonautes.fr

symptômes de sevrage aux neuroleptiques

Publié le 12 mai 2010 par neuroleptiquecache

* idées suicidaires fixes et très forte+++
* nausées+++
* vomissements+++
*angoisses+++
* envie de rien+++
* vertiges
* fatigue intense allant en s'agravant+++
* tachicardie (coeur allant à 130 en continu)+++
* frissons, froid, chaud+++
* Peur de tout
* perte d'appétit+++
* amaigrissement ou prise de poids important+++
* tremblements+++++
* tristesse+++
* dépression+++
* plus dénergie+++
* maux d'estomac+++
* mots de dos+++
* maux de nuque+++
* sommeil inexistant ou intense+++
* confusion
* opression+++
* oublis+++
* absence+++
* se penser atteinte de la maladie d'Alzheimer
* cage thoracique broyée
* épuisement++
* angoisse
* terreur
* ne plus rien comprendre à la vie
* incapacité de faire les choses même quand on en a envie
* enfermement
* douleurs, souffrance totale+++
* sentir son cerveau comme déconnecté+++
* incapacité à être soi
* migraines+++
* se réveiller avec du vomi dans la bouche
* peur de ne pas tenir le coup, se croire irrécupérable
* manque d'équilibre pour se déplacer
* marcher très, très lentement avec les pieds qui traînent
* difficultés à écrire et à tenir un stylo ou autre objet

les-schizonautes.fr

* dyskinésie faciale
* absence de libido
* brûlures importante de la langue, des gencives, de la bouche
* hyper salivation

Voilà les principaux effets que nous avons pu relever aurpès de femmes fréquentant des forum sur AGREAL durant près de 3 ans.

http://www.victimes-agreal.info/neuroleptiques.html *les-schizonautes.fr*

dfsf